

## ВЛИЯНИЕ АЦИЗОЛА НА ТЕЧЕНИЕ ТГЭ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СО (по данным Ильяшенко К.К. и соавт., 2010)

Показатели	Контрольная группа n-32	Лечение Ацизолом n-31
Продолжительность пребывания в стационаре (сутки)	17,3±2,4	11,47±2,09
Продолжительность периода психоневрологических расстройств (часы)	403,5±25,4	230±40,75*
Продолжительность комы (ТГЭ III) (часы)	60,8±15,9	13,9±6,94*
Продолжительность посткоматозного периода (ТГЭ III) (часы)	204,8±47,87	95,3±28,9*
Продолжительность периода жизнеопасных нарушений (ТГЭ II-III)	266,19±51,9	108,8±32,08*
Период постинтоксикационной астении (ТГЭ I)	140,5±32,9	126,3±22,2
Психические нарушения Кол-во больных (%)	24 (75)	15 (48)
Неврологические нарушения Кол-во больных (%)	22 (68,8)	9 (29)*
Развитие пневмонии Кол-во больных (%)	17 (53)	7 (22,6)*
Летальность Кол-во больных (%)	11 (34,3)	4 (12,9)*
Развитие инвалидизирующих осложнений (психоорганический синдром) Кол-во больных (%)	14 (43,75)	7 (22,5)*